



LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÁRVÍZ - BELVÍZ VESZÉLY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐKRŐL

<p>Higiénés kézfertőtlenítést kell végezni minden olyan esetben, amikor a kéz/alkar bőre szennyeződött, illetve szennyeződhetett. Valamint szennyezett tárgyakkal, anyaggal történő munkavégzés után, illetve ételkészítés, étkezés előtt, WC használata után.</p>	<p>Fertőtlenítő oldat: vízben literenként két tablettát Neomagnol feloldva+egy evőkanál ecet. A kezét 1 percig tartsuk benne! Az oldat 4 óráig használható! (kézfertőtlenítéshez bármely közforgalomban kapható kézfertőtlenítő is használható. (pl. Clarasept) használati utasításuk szerint.)</p>
<p>Ivóvíz fertőtlenítése (Abban az esetben, ha a szolgáltató nem biztosít palackos vagy zacskós ivóvizet!)</p>	<ul style="list-style-type: none">• átlátszó víz:<ul style="list-style-type: none">– 20 liter ivásra szánt víz: 2 g Neomagnol por, vagy 2 db Neomagnol tablettát– 2 óra behatási idő után a víz iható• nem átlátszó (<i>zavaros</i>) víz:<ul style="list-style-type: none">– 10 liter víz: 0,1 g klórmész– 2 óra behatási idő után a víz iható• van Klórszag – jó a fertőtlenítés• nincs klórszag – meg kell ismételni a fertőtlenítést
<p>Szennyvíz fertőtlenítése (mosóvíz, fürdővíz, öblítővíz)</p>	<ul style="list-style-type: none">• törzsoldat: 1 m³ szennyvíz – 150 gr klórmész, vagy 5 liter Na-hipoklorit (Hypo)• törzsoldat készítés → szennyvízhez öntés → 2 óra behatás• Na-hipoklorit-90-et hígítás nélkül kell a szennyvízhez adni
<p>Helyiségek fertőtlenítése Csak akkor indokolt végrehajtani, ha a víz a helyiségből visszahúzódott, ebben az esetben a helyiség padlózatáról amennyiben azt nagyobb mennyiségű iszap és egyéb szennyező anyag borítja a szennyeződést egy erre a célra kijelölt helyre távolítsuk el.</p>	<p>A padlózatot, illetve falak beázott részét Neomagnol tablettát 1-2 %-os oldatával kezeljük. 1 m²-nyi felületre 0,2-0,4 liter fertőtlenítő oldat szükséges. 24 órás behatási idő után a padlózatot (falrészeket) ivóvíz minőségű vízzel öblítsük le.</p>
<p>Bútorok, egyéb mosható felszerelési tárgyak fertőtlenítése A vízből kiemelt és néhány órán át szikkadt felületeket kezeljük.</p>	<p>A fertőtlenítéshez 10 db Neomagnol tablettát 1 liter vízben oldjunk fel, majd a vízből kiemelt és megszáradt felületeket ezzel az oldattal mossuk át. Az oldatot hagyjuk a felületre rászáradni. 24 óra elteltével a kezelt felületeket puha textíliával töröljük át.</p>
<p>Szennyezett használati tárgyak fertőtlenítése (pl.: főzőedények, evőeszközök, játékok)</p>	<p>A tisztítás utáni 30 perces áztatása javasolt, hypós oldatban (10 liter vízhez 6 dl hypó) vagy Neomagnolból készített oldatban (literenként 20 tablettát Neomagnol).</p>
<p>Mosható textíliák fertőtlenítése</p>	<p>Egy órás vizes vagy mosószeres áztatás után végezhető el 1 liter vízhez adott 5 db Neomagnol tablettát tartalmazó oldatban további 2 órán át történő áztatással.</p>
<p>Nem mosható textíliák, kárpitozott bútorok, szőnyegek fertőtlenítése</p>	<p>1 liter vízhez 20 tablettát Neomagnolt adva és feloldva az oldattal a fertőtlenítendő textíliát alaposan át kell kefélni. (Vigyázat! A Neomagnol oldat színváltozást okozhat!)</p>

Ásott kutak fertőtlenítése	<ul style="list-style-type: none"> • kútban lévő víz mennyiségének meghatározása • 1 m³-ént: 100 ml Na-hipoklorit-90, vagy 30 gr klórmész • törzsoldat készítés (<i>legalább 10-20 liter</i>) • a törzsoldat aknafalakra történő leöntése • 24 órás behatási idő • érzékszervi vizsgálat: <ul style="list-style-type: none"> – van klórszag – a fertőtlenítés jó – nincs klórszag – a fertőtlenítést meg kell ismételni – hatásos fertőtlenítés után a kút vizét ki kell szivattyúzni
Fúrt kutak fertőtlenítése (Minden esetben soron kívüli vízminőség ellenőrzést kell végezni!)	<ul style="list-style-type: none"> • 300 ml Na-hipoklorit → anyacsöbe • szivattyú járatása → 300 ml Na-hipoklorit • tárolóakna – 100 ml Na-hipoklorit /m³ • csak 30-40 m-es mély kutak fertőtlenítésére alkalmas • ennél mélyebb kutak – területileg illetékes vízügyi hatóság
Klórmész oldat készítési módja	<p><i>250 gr klórmészhez 2 liter vizet öntünk fokozatosan, állandó keverés mellett teljes feloldódásig. Csak frissen készített oldat használható!</i></p> <p>Figyelem! A klórmészpor használata fokozott elővigyázatosságot igényel, belégzését, szembe, nyálkahártyára való jutását kerülni kell. A bőrfelszínt védőkesztyű használatával, ill. testfelszínt takaró ruházattal védeni kell.</p>
Neomagnol-oldat készítési módja	<p>Szennyezettségtől függően 1 liter vízhez 10-20 db Neomagnol tablettát adunk, majd ezt maradék nélkül feloldjuk.</p>
<p>A fertőtlenítést végzőnek védőöltözetet (gumicsizma, műanyag kötény) és egyéni védőeszközt (védőszemüveg és légzést védő) kell viselni!</p>	

Felhívom a figyelmét a következőkre:

- A vezetékes ivóvíz ellátásnál minden átmeneti vízkimaradást, szokatlanul nagy nyomás csökkenést azonnal jelentsenek az Önkormányzatnak, további intézkedésig forralják a vizet, a gyermekek lehetőleg palackozott ivóvizet fogyasszanak.
- A belvízzel/ árvízzel elöntött területeken az ásott kutak és kis mélységű fúrt kutak vize ivásra, háztartási célra még forralva sem használható.
- A belvízzel/ árvízzel érintett területeken lázas betegség, hasmenés esetén feltétlenül forduljanak azonnal orvoshoz.
- Az áradó vizekben, a belvízzel/ árvízzel elöntött kijelölt természetes vizű fürdőhelyeken a fürdés tilos!

Amennyiben kérdése van, az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

ÁNTSZ Szekszárdi Kistérségi Intézete
7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gy. u. 2.
Telefon: 74/505-856
Telefax: 74/ 512-428

ÁNTSZ Bonyhádi Kirendeltsége
7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 13.
Telefon: 74/451-545
Telefax: 74/ 451-545